

**Тарифы на оплату лекарственных препаратов
при лечении коронавирусной инфекции типа (2019-пCoV) в условиях круглосуточного стационара в дополнение к базовому тарифу**

| № п/п | Наименование лекарственного препарата (ЛП) | Код АТХ | Форма выпуска лекарственного препарата (ЛП) | Единица измерения | Дозировка | Схемы назначения | Стоимость единицы измерения, руб. | Максимальная разовая доза | Максимальная суточная доза | Максимальная курсовая доза |
|-------|--|---------|---|-------------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тофацитиниб | L04AA | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | мг | 10 | 2 раза в сутки | 157,32 | 10 | 20 | 280 |
| 2 | Барицитиниб | L04AA | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | мг | 4 | 2 раза в сутки | 395,40 | 4 | 8 | 112 |
| 3 | Левелимаб | L04AC | раствор для подкожного введения | мг | 162 | При недостаточном эффекте повторить введение в течение 24 часов. Возможно повторное введение | 123,46 | 324 | 648 | 972 |
| 4 | Олоклизумаб | L04AC | раствор для подкожного введения | мг | 64 | При недостаточном эффекте повторить введение через 12 часов. Возможно повторное введение | 670,31 | 128 | 256 | 256 |
| 5 | Тоцилизумаб | L04AC | Концентрат для приготовления раствора для инфузий | мг | 4-8 мг/кг | При недостаточном эффекте повторить введение через 12 часов. Возможно повторное введение | 107,64 | 400 | 800 | 1200 |
| 6 | Сарилумаб | L04AC | раствор для подкожного или внутривенного введения | мг | 200 | При недостаточном эффекте повторить введение через 12 часов. Возможно повторное введение | 146,06 | 200 | 400 | 600 |
| 7 | Канакинумаб | L04AC | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | мг | 4-8 мг/кг | однократно | 3 748,78 | 450 | 450 | 450 |
| 8 | Нетакимаб | L04AC | раствор для подкожного введения | мг | 60 | дважды через день. Возможно повторное введение | 166,67 | 120 | 120 | 180 |
| 9 | Экулизумаб | L04AA | концентрат для приготовления раствора для инфузий | мг | 300 | однократно | 910,28 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | Бамланивимаб | x | концентрат для приготовления раствора для инфузий | мг | 700 | однократно | 96,42 | 700 | 700 | 700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-------|---|----|------|-------------------------------------|----------|------|------|------|
| 11 | Этесевимаб | х | концентрат для приготовления раствора для инфузий | мг | 1400 | однократно | 32,14 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 12 | Сотровимаб | х | концентрат для приготовления раствора для инфузий | мг | 500 | однократно | 364,69 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | Абатацепт | L04AA | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | мг | 250 | однократно | 64,24 | 750 | 750 | 750 |
| 14 | Ремдесивир | х | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | мг | 100 | 1 день - 200 мг, 2-10 день - 100 мг | 81,40 | 200 | 200 | 1100 |
| 15 | Иммуноглобулин человека против COVID-19 | J06BB | раствор для инфузий | мл | 50 | однократно | 1 450,00 | 150 | 150 | 150 |