

**Тарифы на оплату лекарственных препаратов  
при лечении коронавирусной инфекции типа (2019-нCoV) в условиях круглосуточного стационара в дополнение к базовому тарифу**

| № п/п | Наименование лекарственного препарата (ЛП) | Код АТХ | Форма выпуска лекарственного препарата (ЛП)                   | Единица измерения | Дозировка | Схемы назначения   | Стоимость единицы измерения, руб. | Максимальная разовая доза | Максимальная суточная доза | Максимальная курсовая доза |
|-------|--|---------|---|-------------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2  | 3       | 4   | 5                 | 6         | 7  | 8                                 | 9                         | 10                         | 11                         |
| 1     | Тофацитиниб                                | L04AA   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        | мг                | 10        | 2 раза в сутки   | 157,32                            | 10                        | 20                         | 280                        |
| 2     | Барицитиниб                                | L04AA   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                        | мг                | 4         | 2 раза в сутки   | 395,40                            | 4                         | 8                          | 112                        |
| 3     | Левелимаб                                  | L04AC   | раствор для подкожного введения                               | мг                | 162       | При недостаточном эффекте повторить введение в течение 24 часов. Возможно повторное введение | 161,37                            | 324                       | 648                        | 972                        |
| 4     | Олокизумаб                                 | L04AC   | раствор для подкожного введения                               | мг                | 64        | При недостаточном эффекте повторить введение через 12 часов. Возможно повторное введение     | 670,31                            | 128                       | 256                        | 256                        |
| 5     | Тоцилизумаб                                | L04AC   | Концентрат для приготовления раствора для инфузий             | мг                | 4-8 мг/кг | При недостаточном эффекте повторить введение через 12 часов. Возможно повторное введение     | 107,64                            | 400                       | 800                        | 1200                       |
| 6     | Сарилумаб                                  | L04AC   | раствор для подкожного или внутривенного введения             | мг                | 200       | При недостаточном эффекте повторить введение через 12 часов. Возможно повторное введение     | 146,06                            | 200                       | 400                        | 600                        |
| 7     | Канакинумаб                                | L04AC   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | мг                | 4-8 мг/кг | однократно   | 3 748,78                          | 450                       | 450                        | 450                        |
| 8     | Нетакимаб                                  | L04AC   | раствор для подкожного введения                               | мг                | 60        | дважды через день. Возможно повторное введение   | 166,67                            | 120                       | 120                        | 180                        |
| 9     | Экулизумаб                                 | L04AA   | концентрат для приготовления раствора для инфузий             | мг                | 300       | однократно   | 910,28                            | 900                       | 900                        | 900                        |
| 10    | Бамланивимаб                               | x       | концентрат для приготовления раствора для инфузий             | мг                | 700       | однократно   | 96,42                             | 700                       | 700                        | 700                        |
| 11    | Эгесевимаб                                 | x       | концентрат для приготовления раствора для инфузий             | мг                | 1400      | однократно   | 32,14                             | 1400                      | 1400                       | 1400                       |
| 12    | Сотровимаб                                 | x       | концентрат для приготовления раствора для инфузий             | мг                | 500       | однократно   | 364,69                            | 500                       | 500                        | 500                        |

| 1  | 2                                       | 3     | 4   | 5  | 6   | 7   | 8        | 9    | 10   | 11   |
|----|---|-------|---|----|-----|---|----------|------|------|------|
| 13 | Абатацепт                               | L04AA | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | мг | 250 | однократно  | 64,24    | 750  | 750  | 750  |
| 14 | Ремдесивир                              | x     | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | мг | 100 | 1 день - 200 мг, 2-10 день - 100 мг   | 81,40    | 200  | 200  | 1100 |
| 15 | Иммуноглобулин человека против COVID-19 | J06BB | раствор для инфузий   | мл | 50  | однократно  | 1 450,00 | 150  | 150  | 150  |
| 16 | Регданвимаб                             | x     | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               | мг | 960 | однократно  | 61,16    | 4800 | 4800 | 4800 |
| 17 | Бамланивимаб                            | x     | раствор для инфузий   | мг | 700 | однократно  | 92,86    | 700  | 700  | 700  |
| 18 | Этесевимаб                              | x     | раствор для инфузий   | мг | 700 | однократно  | 31,57    | 1400 | 1400 | 1400 |
| 19 | Касиривимаб                             | x     | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               | мг | 300 | однократно  | 121,54   | 600  | 1200 | 1200 |
| 20 | Имдевимаб                               | x     | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               | мг | 300 | однократно  | 121,54   | 600  | 1200 | 1200 |
| 21 | Анакинра                                | L04AC | раствор для подкожного введения   | мг | 100 | Схема 1. 1-3 день по 200 мг каждые 12 ч., 4 день- 100 мг каждые 12 ч., 5 день- 100 мг Схема 2. 100 мг 7-10 дней, Схема 3. 200 мг каждые 8 ч. 7 дней | 32,58    | 200  | 600  | 4200 |
| 22 | Молнупиравир                            | J05AX | капсулы   | мг | 200 | 800 мг перорально каждые 12 ч в течение 5 дней  | 0,80     | 800  | 1600 | 8000 |